МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛСР-000133/08-080413
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Пирацетам

раствор для внутривенного и внутримышечного введения 200 мг/мл

ОАО «Органика», Россия

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «____» 08 04 13 201___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав В 1 мл раствора препарата содержится 200 мг пирацетама, вспомогательные вещества: натрия ацетат, кислота уксусная разведённая, вода для инъекций.	**Состав** 1 мл раствора содержит активное вещество: пирацетам - 200 мг; вспомогательные вещества: натрия ацетат – 1 мг, уксусная кислота разведенная 30 % - до pH 5,8, вода для инъекций – до 1 мл.
Симптомы передозировки, меры по оказанию помощи при передозировке Отсутствует	**Симптомы передозировки, меры по оказанию помощи при передозировке** Симптомы: абдоминальная боль, диарея с примесью крови. Лечение: симптоматическая терапия, которая может включать гемодиализ (эффективность 50-60 %). Специфического антидота нет.
Особые указания. При лечении больных кортикальной миоклонией следует избегать резкого прерывания лечения, что может вызвать возобновление приступов. При длительной терапии пожилых больных рекомендуется регулярный контроль за показателями функции почек, при необходимости проводят коррекцию дозы в зависимости от результатов исследования	**Особые указания** При лечении больных кортикальной миоклонией следует избегать резкого прерывания лечения, что может вызвать возобновление приступов. При длительной терапии пожилых больных рекомендуется регулярный контроль за показателями функции почек, при необходимости проводят коррекцию дозы в зависимости от результатов исследования клиренса креати-

Старая редакция	Новая редакция
клиренса креатинина. Принимая во внимание возможные побочные эффекты, следует соблюдать осторожность при выполнении работы с механизмами и вождении автомобиля. Проникает через фильтрующие мембраны аппаратов для гемодиализа.	нина. Проникает через фильтрующие мембраны аппаратов для гемодиализа. **Сведения о возможном влиянии лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами, механизмами** В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта, выполнении работы с механизмами, занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.
Условия хранения Список Б. В защищённом от света месте при температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.	**Условия хранения** В защищенном от света месте при температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Технический директор
ОАО «Органика» Р.В. Гусс

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Открытое Акционерное Общество "ОРГАНИКА"
г. Новгород Новгородской области