

**Листок-вкладыш - информация для пациента**

Мельдоний Органика, 100 мг/мл, раствор для инъекций

Действующее вещество: Мельдоний

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу. Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

**Содержание листка-вкладыша**

1. Что из себя представляет препарат Мельдоний Органика, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Мельдоний Органика.
3. Применение препарата Мельдоний Органика.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Мельдоний Органика.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

**1. Что из себя представляет препарат Мельдоний Органика, и для чего его применяют**

Препарат Мельдоний Органика содержит действующее вещество мельдоний (в виде дигидрата).

Мельдоний относится к метаболическим средствам, нормализующим процессы обмена веществ в организме.

Мельдоний является структурным аналогом вещества, встречающегося в каждой клетке организма - гамма-бутиробетаина. В основе действия этого препарата лежит позитивное влияние на энергетический обмен вещества организма, а также легкая активация центральной нервной системы.

Во время нагрузки мельдоний возобновляет равновесие между доставкой и потреблением кислорода в клетках, активирует в них процессы обмена веществ, которым для производства энергии нужно меньшее потребление кислорода. Обычно в условиях повышенной нагрузки в организме быстро наступает истощение сил, но в результате применения мельдония организм

привыкает выдерживать нагрузку, экономично использовать кислород и быстро восстанавливать энергетические резервы для подготовки к новым нагрузкам.

Мельдоний, выполняя функции гамма-бутиробетаина, может ускорить передачу нервного импульса в организме, в связи с чем ускоряются все ответные реакции, улучшается общий обмен веществ в организме. Поэтому при применении мельдония ощущается тонизирующий эффект – улучшается память, ускоряется мышление, возрастает ловкость движений, увеличивается сопротивляемость организма вредным условиям.

### **Показания к применению**

Препарат Мельдоний Органика применяется у взрослых:

- в комплексной терапии ишемической болезни сердца (стенокардия, инфаркт миокарда); хроническая сердечная недостаточность и кардиомиопатия на фоне дисгормональных нарушений, а также в комплексной терапии острых и хронических нарушений кровоснабжения головного мозга (инфаркт и цереброваскулярная недостаточность);
- гемофтальм и кровоизлияния в сетчатку различной этиологии, тромбоз центральной вены сетчатки и ее ветвей, ретинопатии различной этиологии (диабетическая, гипертоническая);
- сниженная работоспособность; умственные и физические перегрузки (в том числе у спортсменов). Препарат может давать положительный результат при проведении допинг контроля (см. раздел «Особые указания и меры предосторожности»);
- синдром абстиненции при хроническом алкоголизме (в комбинации со специфической терапией алкоголизма).

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

### **2. О чём следует знать перед применением препарата Мельдоний Органика**

#### **Противопоказания**

Не применяйте препарат Мельдоний Органика:

- если у Вас аллергия на мельдоний;
- если у Вас новонышние внутричерепного давления (при нарушении венозного оттока, внутричерепных опухолях);
- если Ваш возраст младше 18 лет (см. раздел «Дети и подростки»);
- если Вы беременны, или думаете, что можете быть беременны (см. раздел «Беременность, грудное вскармливание»);
- если Вы кормите ребенка грудью (см. раздел «Беременность, грудное вскармливание»).

## **Особые указания и меры предосторожности**

Перед применением препарата Мельдоний Органика проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Расскажите врачу, если болели печеночной и/или почечной недостаточностью, так как может понадобиться провести контроль показателей деятельности печени и/или почек. Поскольку препарат выводится из организма через почки, пациентам с нарушениями деятельности почек от легкой до средней степени тяжести следует применять меньшую дозу мельдония.

Многолетний опыт лечения острого инфаркта миокарда и нестабильной стенокардии в кардиологических отделениях показывает, что мельдоний не является препаратом 1 ряда при остром коронарном синдроме и его применение не является остро необходимым.

С 1 января 2016 года мельдоний включен в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства.

### **Дети и подростки**

Этот препарат нельзя применять детям и подросткам в возрасте до 18 лет, так как данные о безопасности и эффективности применения в данной возрастной группе отсутствуют.

### **Другие препараты и препарат Мельдоний Органика**

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Препарат можно сочетать с лекарственными препаратами, применяемыми для лечения стенокардии, антикоагулянтами (снижающими свертываемость крови), антиагрегантами (предотвращающими образование тромбов в кровеносных сосудах), препаратами, устраняющими нарушения сердечного ритма, диуретиками (повышающими выработку мочи и выведение ее из организма), бронхолитиками (снимающими бронхоспазм).

Мельдоний усиливает действие сердечных гликозидов.

Ввиду возможного развития умеренной тахикардии (увеличение частоты сердечных сокращений) и артериальной гипотензии (снижение артериального давления), следует соблюдать осторожность при комбинации с нитроглицерином, нифедипином, альфа-адреноблокаторами, а также другими средствами, снижающими артериальное давление и обладающими сосудорасширяющими свойствами, так как мельдоний усиливает их действие. Поэтому при необходимости применения мельдония с данными препаратами необходимо проводить оценку частоты сердечных сокращений и величины артериального давления.

## **Беременность, грудное вскармливание**

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Мельдоний Органика противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания (см. раздел «Противопоказания»).

Если матери необходимо применять Мельдоний Органика в период грудного вскармливания, кормление грудью следует прекратить.

## **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Нет данных о неблагоприятном влиянии препарата Мельдоний Органика на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

## **3. Применение препарата Мельдоний Органика**

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

### **Рекомендуемая доза**

#### **Взрослые**

##### ***Сердечно-сосудистые заболевания***

В составе комплексной терапии:

- ишемической болезни сердца (инфаркт миокарда) внутривенно струйно по 0,5 - 1,0 г в день (5 - 10 мл препарата Мельдоний Органика);
- ишемической болезни сердца (стабильная стенокардия); хронической сердечной недостаточности и невоспалительных заболеваний миокарда, развивающихся на фоне гормональных нарушений (дисгормональная кардиомиопатия) внутривенно струйно по 0,5 - 1,0 г в день (5 - 10 мл препарата Мельдоний Органика) или внутримышечно по 0,5 г 1 - 2 раза в сутки, курс лечения 10 - 14 дней, с последующим переходом на лекарственную форму для приема внутрь по 0,5 г. Общий курс лечения 4 - 6 недель.

##### ***Нарушение мозгового кровообращения***

В составе комплексной терапии в острой фазе по 0,5 г (5 мл препарата Мельдоний Органика) 1 раз в день внутривенно в течение 10 дней, с последующим переходом на лекарственную форму для приема внутрь по 0,5 – 1 г. Общий курс лечения 4 - 6 недель.

При хронической недостаточности мозгового кровообращения (дисциркуляторной энцефалопатии) по 0,5 г. (5 мл препарата Мельдоний Органика) внутримышечно или

внутривенно 1 раз в день в течение 10 дней, с последующим переходом на лекарственные формы для приема внутрь по 0,5 г. Общий курс лечения 4 - 6 недель.

Повторные курсы (обычно 2 - 3 раза в год) возможны после консультации с врачом.

*Офтальмопатология (гемофтальм и кровоизлияния в сетчатку различной этиологии, тромбоз центральной вены сетчатки и ее ветвей, поражения сетчатки (ретинопатии) различной этиологии (диабетическая, гипертоническая))*

По 0,05 г (0,5 мл препарата Мельдоний Органика) парабульбарно в течение 10 дней. В том числе применяется в составе комбинированной терапии.

#### *Умственные и физические перегрузки*

По 0,5 г (5 мл препарата Мельдоний Органика) внутримышечно или внутривенно 1 раз в день. Курс лечения 10 - 14 дней. При необходимости лечение повторяют через 2 - 3 недели.

#### *Хронический алкоголизм*

По 0,5 г (5 мл препарата Мельдоний Органика) внутримышечно или внутривенно 2 раза в день. Курс лечения 7 - 10 дней.

#### **Применение у детей и подростков**

Поскольку данные о безопасности и эффективности применения мельдония у детей и подростков в возрасте до 18 лет отсутствуют, его применение в данной возрастной категории противопоказано (см. раздел «Противопоказания»).

#### **Путь и способ введения**

Мельдоний Органика вводят внутримышечно, внутривенно и парабульбарно.

Применение препарата не предусматривает специального приготовления перед введением.

Ввиду возможного развития возбуждающего эффекта, рекомендуется принимать в первой половине дня.

#### **Если Вы применили препарата Мельдоний Органика больше, чем следовало**

Если Вы случайно применили большую дозу препарата, необходимо немедленно проинформировать врача или обратиться в ближайшее отделение неотложной помощи.

Ранее о случаях передозировки мельдонием не сообщалось. Препарат малотоксичен и не вызывает угрожающих нежелательных реакций.

Симптомы: снижение артериального давления, сопровождающееся головной болью, учащенное сердцебиение (тахикардия), головокружением и общей слабостью.

Лечение: симптоматическое.

В случае тяжелой передозировки необходимо контролировать функции печени и почек. Гемодиализ не имеет существенного значения в связи с выраженным связыванием мельдония с белками.

#### **Если Вы забыли применить препарат Мельдоний Органика**

Если Вы пропустили инъекцию препарата Мельдоний Органика, сделайте это незамедлительно. Однако если уже приближается время следующего введения, пропустите забытую инъекцию и продолжайте применение препарата, как рекомендовано, соблюдая обычные интервалы между применением препарата. Не применяйте двойную дозу для замены забытой дозы.

#### **Если прекратили применение препарата Мельдоний Органика**

При прекращении применения этого препарата, нежелательные реакции не наблюдаются.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

#### **4. Возможные нежелательные реакции**

##### **Описание нежелательных реакций**

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызвать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

*Редко* (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000)

- аллергические реакции (покраснения, высыпания, зуд);
- возбуждение;
- увеличение частоты сердечных сокращений (тахикардия);
- снижение или повышение артериального давления;
- чувство боли или дискомфорта в верхней части живота (диспептические явления).

*Очень редко* (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000)

- увеличение числа специфических белых клеток крови (эозинофилия);
- общая слабость.

##### **Сообщение о нежелательных реакциях**

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в этом листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

·       Российская Федерация ·

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения  
 Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1, 109074, Россия  
 +7 (495) 698-45-38  
[www.roszdravnadzor.ru](http://www.roszdravnadzor.ru)

## **5. Хранение препарата Мельдоний Органика**

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

### **Дата истечения срока годности (срока хранения)**

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на картонной пачке и на каждом блистере после «до».

Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

### **Условия хранения**

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C.

### **Предупреждения о признаках непригодности препарата к применению**

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

## **6. Содержимое упаковки и прочие сведения**

### **Препарат Мельдоний Органика содержит**

Действующим веществом является мельдоний.

1 мл раствора содержит 100 мг мельдония (в виде дигидрата).

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются вода для инъекций.

### **Внешний вид препарата Мельдоний Органика и содержимое его упаковки**

*Лекарственная форма:* раствор для инъекций.

*Описание:* прозрачная бесцветная жидкость.

*Форма выпуска:* По 5 мл в стеклянные ампулы. По 5 ампул в контурной ячейковой упаковке.

1 или 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

### **Держатель регистрационного удостоверения и производитель**

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения.

Россия

Акционерное общество «Органика» (АО «Органика»)

Адрес: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, шоссе Кузнецкое, д. 3, 654034 - Россия

тел. (3843) 994-222, факс 994-200  
root@organica.su.

**Листок-вкладыш пересмотрен:**

**Прочие источники информации**

Подробные сведения о лекарственном препарате содержатся на веб-сайте Союза:  
<http://www.eurasiacommission.org>.

ФГБУ	МЗ РФ	ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ	ИЗДАНИЕ
		ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ	
		ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА	
		0 0 0 0 0 0 0 0 1 1	