ЛП-№(009825)-(РГ-RU) от 18.08.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.08.2026 № 15938
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Пентоксифиллин, 20 мг/мл, раствор для внутривенного и внутриартериального введения

Действующее вещество: пентоксифиллин

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Пентоксифиллин, и для чего его применяют.

2. О чем следует знать перед применением препарата Пентоксифиллин.

3. Применение препарата Пентоксифиллин.

4. Возможные нежелательные реакции.

5. Хранение препарата Пентоксифиллин.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Пентоксифиллин, и для чего его применяют

Препарат Пентоксифиллин содержит действующее вещество пентоксифиллин, относящееся к группе лекарственных препаратов, называемых периферические вазодилататоры; производные пурина.

Показания к применению

Препарат Пентоксифиллин применяется у взрослых в возрасте от 18 лет.

• Окклюзионная болезнь периферических артерий атеросклеротического или диабетического генеза (например, перемежающаяся хромота, диабетическая ангиопатия);

• трофические нарушения (например, трофические язвы голеней, гангрена);

• нарушения мозгового кровообращения (последствия церебрального атеросклероза, как, например, снижение концентрации внимания, головокружение, ухудшение памяти), ишемические и постинсультные состояния;

• нарушения кровообращения в сетчатой и сосудистой оболочке глаза;

• отосклероз, дегенеративные изменения на фоне патологии сосудов внутреннего уха и снижения слуха.

Способ действия препарата Пентоксифиллин

После попадания в организм пентоксифиллин взаимодействует с ферментом, называемым «фосфодиэстераза». Это приводит к накоплению в клетках крови и мышцах внутренних органов, и сосудов некоторого вещества, регулирующего передачу сигналов внутри клетки

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.08.2026 № 15938
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

(циклический аденозинмонофосфат (цАМФ)). В результате пентоксифиллин уменьшает вязкость и улучшает «текучесть» крови, расширяет сосуды (сосудорасширяющее действие), улучает циркуляцию крови (микроциркуляцию) в местах нарушенного кровообращения, увеличивает силу сердечных сокращений (слабый положительный инотропный эффект). Поэтому при применении препарата Пентоксифиллин улучшаются симптомы нарушений мозгового кровообращения. При нарушении кровообращения рук и ног (окклюзионные заболевания периферических артерий) применение препарата Пентоксифиллин приводит к удлинению дистанции ходьбы, устранению ночных судорог в икроножных мышцах и исчезновению боли в покое.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Пентоксифиллин

Противопоказания

Не применяйте препарат Пентоксифиллин:

• если у Вас аллергия на пентоксифиллин, другие препараты со схожей химической структурой (метилксантины) или любые другие компоненты данного препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);

• если у Вас массивное кровотечение (так как есть риск усиления кровотечения);

• если у Вас обширные кровоизлияния в сетчатую оболочку глаза (так как есть риск усиления кровотечения);

• если у Вас кровоизлияние в головной мозг;

• если у Вас сердечный приступ (острый инфаркт миокарда);

• если Вы беременны (так как недостаточно данных по применению этого препарата);

• если Вы кормите ребёнка грудью (так как недостаточно данных по применению этого препарата).

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Пентоксифиллин проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Обязательно поговорите с врачом перед тем, как начать лечение препаратом, если что-либо из перечисленного ниже относится к Вам:

• если у Вас серьезно нарушен ритм сердца, так как есть риск усугубления Вашего состояния (риск ухудшения аритмии);

• если у Вас низкое артериальное давление (артериальная гипотензия), так как есть риск дальнейшего снижения артериального давления;

• если у Вас высокий риск снижения артериального давления (например, при заболевании, вызванном недостаточным обеспечением сердца кислородом (тяжелой ишемической болезни сердца) или при сужении сосудов головного мозга (гемодинамически значимых стенозах));

• если у Вас снижение насосной функции сердца (хроническая сердечная недостаточность);

• если у Вас нарушена функция почек (когда клиренс креатинина менее 30 мл/мин), так как возможно накопление препарата Пентоксифиллин в организме и повышен риск возникновения нежелательных реакций;

• если у Вас серьезно нарушена функция печени, так как возможно накопление препарата Пентоксифиллин в организме и повышен риск возникновения нежелательных реакций;

• если Вы недавно перенесли оперативное вмешательство, так как при применении препарата Пентоксифиллин необходим контроль параметров крови (гемоглобин и гематокрит);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.08.2026 № 15938
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

• если у Вас повышенный риск развития кровотечений (например, при нарушениях в системе свертывания крови), так как есть риск развития тяжелых кровотечений;

• если Вы принимаете препараты для уменьшения вязкости крови (антикоагулянты, в том числе, непрямые антикоагулянты – антагонисты витамина К), так как необходим контроль показателей свертывания крови;

• если Вы принимаете препараты, способствующие разжижению крови (ингибиторы агрегации тромбоцитов, например, клопидогрел, эптифибатид, тирофибан, эпопростенол, илопрост, абциксимаб, анагрелид), препараты с обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным эффектом (нестероидные противовоспалительные средства, кроме селективных ингибиторов циклооксигеназы-2, например, ацетилсалициловая кислота, тиклопидин, дипиридамол);

• если Вы принимаете препараты для лечения сахарного диабета (гипогликемические средства, в том числе для приема внутрь, инсулин);

• если Вы принимаете ципрофлоксацин (препарат для лечения бактериальных инфекций);

• если Вы принимаете теофиллин (препарат для лечения бронхиальной астмы);

• если у Вас из-за холестериновых бляшек сужен просвет сосудов сердца (атеросклероз коронарных артерий) или головного мозга (атеросклероз церебральных артерий), так как Вам может потребоваться снижение дозы препарата Пентоксифиллин;

• если Вы пожилого возраста, так как Вам может потребоваться снижение дозы препарата Пентоксифиллин;

• если Вы курите, так как курение может снижать эффективность препарата Пентоксифиллин.

Во время лечения препаратом Пентоксифиллин Ваш врач будет контролировать Ваше артериальное давление.

Если у Вас сахарный диабет и Вы принимаете препараты для снижения уровня глюкозы крови (гипогликемические препараты), то при применении препарата Пентоксифиллин Ваш врач может скорректировать дозы этих препаратов и контролировать Ваш уровень глюкозы крови.

При применении препарата Пентоксифиллин Вам следует находится в положении лежа.

Дети и подростки

Не применяйте препарат у детей в возрасте от 0 до 18 лет поскольку эффективность и безопасность применения препарата в данной возрастной группе не установлены.

Другие препараты и препарат Пентоксифиллин

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

Обязательно сообщите своему врачу, если Вы принимаете, недавно принимали или планируете начать принимать любые лекарства из перечисленных ниже:

• препараты для лечения повышенного артериального давления (гипотензивные средства, например, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента);

• препараты, которые могут снижать артериальное давление, например, нитраты (препараты для лечения заболеваний сердца и сосудов);

• препараты, применяемые для профилактики образования и роста кровяных сгустков (тромбов) в сосудах, а также для лечения тромбозов (прямые и непрямые антикоагулянты, тромболитики);

• препараты для лечения бактериальных инфекций (цефалоспорины, ципрофлоксацин);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.08.2026 № 15938
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

• кеторолак (обезболивающий препарат);

• циметидин (препарат для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки);

• ксантины (препараты, схожие по химической структуре с пентоксифиллином, например, теофиллин (препарат для лечения бронхиальной астмы));

• препараты для лечения сахарного диабета (инсулин и гипогликемические препараты в таблетках);

• препараты, способствующие разжижению крови (ингибиторы агрегации тромбоцитов), такие как клопидогрел, эптифибатид, тирофибан, эпопростенол, илопрост, абциксимаб, анагрелид, ацетилсалициловая кислота, тиклопидин, дипиридамол;

• обезболивающие и противовоспалительные препараты (нестероидные противовоспалительные средства), кроме препаратов из группы селективных ингибиторов циклооксигеназы-2.

Если Вы не уверены какими препаратами Вы лечитесь и относятся ли они к перечисленному выше списку, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Беременность

Не применяйте препарат Пентоксифиллин.

Грудное вскармливание

Пентоксифиллин проникает в грудное молоко в незначительных количествах. Не применяйте препарат Пентоксифиллин, если Вы кормите ребёнка грудью, так как это может навредить Вашему ребёнку. Если применение этого препарата Вам необходимо, то обсудите с врачом вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Пентоксифиллин оказывает влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

В период лечения препаратом Пентоксифиллин может возникнуть головокружение, поэтому Вам следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятиях другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты реакций.

Необходимо проконсультироваться с лечащим врачом в случае, если Вы планируете управлять транспортными средствами или работать с механизмами.

Препарат Пентоксифиллин содержит натрий

Данный лекарственный препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на 1 мл, то есть по сути, не содержит натрия.

3. Применение препарата Пентоксифиллин

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

Рекомендуемая доза

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.08.2026 № 15938
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Доза и частота применения препарата Пентоксифиллин зависят от вида и тяжести Вашего заболевания, поэтому их Вам подберёт врач в зависимости от Вашего состояния. Прислушивайтесь к рекомендациям Вашего врача.

Обычная доза препарата Пентоксифиллин составляет от 100 мг до 600 мг 1 или 2 раза в сутки. Перед применением врач или медицинская сестра разведет препарат в 250 мл или 500 мл 0,9 % раствора натрия хлорида или раствора Рингера. 100 мг препарата Вам будут вводить не менее 60 минут.

Ваш врач может назначить Вам дополнительно к инфузионной терапии пентоксифиллин для приема внутрь. При этом общая суточная доза пентоксифиллина (внутривенная инфузия + прием внутрь) не должна превышать 1200 мг.

В тяжелых случаях врач может принять решение о том, что Вам необходимо применение препарата Пентоксифиллин в дозе 1200 мг в течение 24 часов. В этом случае дозу этого препарата Вам разделят на два инфузионных введения по 600 мг, каждое из которых будет продолжаться не менее 6 часов. Врач может подобрать Вам индивидуальную дозу, исходя из Вашей массы тела.

Для продолжения терапии врач назначит Вам пентоксифиллин для приема внутрь.

Особые группы пациентов

Лица пожилого возраста

Если Вы пожилого возраста, то врач может уменьшить Вам дозу препарата Пентоксифиллин.

Пациенты с почечной недостаточностью

Если у Вас нарушена функция почек (почечная недостаточность), то врач может уменьшить Вам дозу препарата Пентоксифиллин.

Пациенты с печеночной недостаточностью

Если у Вас серьезно нарушена функция печени, то врач может уменьшить Вам дозу препарата Пентоксифиллин.

Пациенты с низким артериальным давлением

Если у Вас снижено артериальное давление или есть риск снижения артериального давления (например, если у Вас тяжелая форма ишемической болезни сердца или есть гемодинамически значимые стенозы сосудов головного мозга), то врач начнет лечение препаратом Пентоксифиллин с низких доз. Увеличивать Вам дозу этого препарата врач будет только постепенно.

Применение у детей и подростков

Поскольку данные о безопасности и эффективности применения пентоксифиллина у детей в возрасте до 18 лет отсутствуют, его применение в данной возрастной категории противопоказано.

Путь и (или) способ введения

Препарат Пентоксифиллин вводят внутривенно и внутриартериально.

Если Вы применили препарата Пентоксифиллин больше, чем следовало

Препарат будет вводить врач или медицинская сестра, поэтому передозировка маловероятна. Однако, если Вы сомневаетесь в правильности введённой Вам дозы, то сообщите об этом врачу или медицинской сестре.

При передозировке возможно возникновение слабости, головокружения, выраженного снижения артериального давления, повышения частоты сердечных сокращений (тахикардия), сонливости, потери сознания, судорог, повышения нервной возбудимости, повышения

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.08.2026 № 15938
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

температуры тела (гипертермия), угнетения рефлексов (арефлексия), появления признаков кровотечения из желудочно-кишечного тракта (рвота типа «кофейной гущи»).

Если Вы забыли применить препарат Пентоксифиллин

Препарат будет вводить врач или медицинская сестра, поэтому ситуация с пропуском дозы маловероятна. Если Вы сомневаетесь, сообщите об этом врачу или медицинской сестре.

Если Вы прекратили применение препарата Пентоксифиллин

Не прекращайте применение препарата Пентоксифиллин, не посоветовавшись со своим лечащим врачом. Если окончить курс лечения раньше необходимого, то препарат может не оказать должного эффекта, а Ваши симптомы могут возобновиться. При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Сообщите врачу или медицинской сестре, если при применении препарата Пентоксифиллин Вы почувствуете симптомы тяжелых нежелательных реакций, которые наблюдались со следующей частотой (Вам прекратят введение препарата и немедленно окажут всю необходимую помощь):

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

• аллергическая реакция – реакция гиперчувствительности (затрудненное дыхание или глотание, головокружение, отек лица, губ, языка или горла, сильный зуд кожи, появление сыпи или волдырей).

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

• аллергическая реакция – анафилактическая или анафилактоидная реакция (ощущения беспокойства, ощущение покалывания, головокружение, зуд по всему телу, появление зудящих волдырей на коже и слизистых, отеки, хрипы, затрудненное дыхание, обморок);

• тяжёлая аллергическая реакция – отёк Квинке (мгновенный и массивный отек кожи и слизистых оболочек, особенно опасен в области головы и шеи);

• спазм бронхов – бронхоспазм (внезапное свистящее дыхание, боль в груди, одышка или затрудненное дыхание);

• тяжёлая аллергическая реакция – анафилактический шок (боль и отёк в месте инъекции, ощущение жара, распространяющийся по телу зуд, затруднение дыхания и глотания, кашель, побледнение или покраснение кожи, ощущение сжатия под ребрами, слабость, сильное головокружение, снижение артериального давления, нарушение сознания, судороги);

• кровоизлияние в полость черепа – внутричерепное кровотечение (нарушение речи, судороги, сильная головная боль («кинжальная» боль), тошнота и/или рвота, головокружение, потеря сознания);

• воспаление мозговых оболочек – асептический менингит (повышенный тонус (ригидность) затылочных мышц, головная боль, тошнота, рвота, лихорадка и потеря ориентации);

• нарушение зрения – отслоение сетчатой оболочки глаза («вспышки» света в глазах, ограничение полей зрения, появление «нитей» перед глазами, снижение зрения);

• серьезная кожная реакция – токсический эпидермальный некроз, синдром Стивенса-Джонсона (лихорадка, недомогание, появление болезненных пятен на коже в любых частях тела, которые сливаясь образуют большие пузыри, корки и эрозии в ротовой полости,

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.08.2026 № 15938
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

высыпания на половых органах, отслаивание или отшелушивание больших участков кожи, что может свидетельствовать о развитии серьезной аллергии на коже).

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при применении препарата Пентоксифиллин.

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

• покраснение (гиперемия) кожи лица;

• тошнота;

• рвота;

• вздутие живота;

• чувство тяжести в желудке;

• жидкий стул (диарея).

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

• повышенная возбудимость;

• бессонница;

• головокружение;

• неконтролируемое ритмичное сокращение мышц, которое чаще возникает в конечностях (тремор);

• головная боль;

• нарушение зрения;

• воспаление слизистой оболочки глаза (конъюнктивит);

• нарушение ритма сердца;

• повышение частоты сердечных сокращений (тахикардия);

• кожный зуд;

• покраснение кожи (эритема);

• появление на коже и слизистых зудящих волдырей (крапивница);

• повышение температуры тела.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

• кровотечения (в том числе носовые кровотечения, желудочно-кишечные кровотечения, кровотечения из мочевыводящих путей);

• давящая или щемящая боль в области сердца (стенокардия);

• затруднение дыхания (одышка);

• снижение артериального давления;

• отеки конечностей (периферические отеки).

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

• снижение числа кровяных пластинок (тромбоцитов) в крови (тромбоцитопения);

• кровоизлияния в кожу, кровотечение из носа, десен, обильные месячные вследствие снижения числа тромбоцитов в крови (тромбоцитопеническая пурпура);

• снижение числа эритроцитов и содержания гемоглобина в крови (апластическая анемия);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.08.2026 № 15938
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

• снижение числа всех клеток крови (панцитопения);

• боль, жжение, покалывание на коже, ощущение «ползания мурашек» (парестезия);

• судороги;

• кровоизлияние в сетчатую оболочку глаза;

• повышение артериального давления;

• нарушение нормального оттока желчи (внутрипеченочный холестаз);

• повышение уровня «печеночных» ферментов при лабораторном анализе;

• повышенное потоотделение.

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно):

• снижение числа белых клеток (лейкоцитов/нейтрофилов) в крови (лейкопения/нейтропения);

• снижение уровня фибриногена в крови (гипофибриногенемия);

• тревога;

• появление слепых участков в поле зрения (скотома);

• сухость полости рта (ксеростомия);

• нервное расстройство, при котором происходит частичный или полный отказ от питания, отсутствует аппетит (анорексия);

• запор;

• повышенное слюноотделение (гиперсаливация);

• изменения в лабораторном анализе крови (повышение активности щелочной фосфатазы);

• кожная сыпь;

• повышенная ломкость ногтей.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 800 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

https://www.roszdravnadzor.gov.ru

5. Хранение препарата Пентоксифиллин

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке и на каждой ампуле после «до …».

Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.08.2026 № 15938
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Храните при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке (ампулы в пачке) для защиты от света.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Пентоксифиллин содержит

Действующим веществом является пентоксифиллин.

Каждый мл раствора содержит 20 мг пентоксифиллина.

Каждая ампула объемом 5 мл содержит 100 мг пентоксифиллина.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются натрия хлорид, натрия дигидрофосфата дигидрат, 1 М раствор натрия гидроксида, вода для инъекций.

Внешний вид препарата Пентоксифиллин и содержимое упаковки

Раствор для внутривенного и внутриартериального введения.

Прозрачная бесцветная или слегка окрашенная жидкость.

По 5 мл в ампулы нейтрального стекла марки НС-3 или 1-го гидролитического класса.

По 5 ампул помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки, изготовленной из полимерных материалов.

1 или 2 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Российская Федерация

Акционерное общество «Органика» (АО «Органика»)

Адрес: 654034, Кемеровская обл. - Кузбасс, г.о. Новокузнецкий, г. Новокузнецк, район Кузнецкий, шоссе Кузнецкое, д. 3

Тел. (3843) 994-222

Адрес электронной почты: root@organica.su

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

Акционерное общество «Органика» (АО «Органика»)

Адрес: Кемеровская обл. - Кузбасс, г.о. Новокузнецкий, г. Новокузнецк, район Кузнецкий, шоссе Кузнецкое, д. 3, 654034 – Российская Федерация

Тел. (3843) 994-222

Адрес электронной почты: root@organica.su

Прочие источники информации

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.08.2026 № 15938
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) https://www.grls.rosminzdrav.ru (https://www.lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC).