ЛП-№(005308)-(РГ-RU) от 16.10.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 14.10.2026 № 19592
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Фебуксостат Органика, 80 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Фебуксостат Органика, 120 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Действующее вещество: фебуксостат

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Фебуксостат Органика, и для чего его применяют.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Фебуксостат Органика.

3. Прием препарата Фебуксостат Органика.

4. Возможные нежелательные реакции.

5. Хранение препарата Фебуксостат Органика.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Фебуксостат Органика, и для чего его применяют

Препарат Фебуксостат Органика содержит действующее вещество фебуксостат, относящееся к группе: противоподагрические препараты; препараты, ингибирующие синтез мочевой кислоты. Фебуксостат снижает повышенную концентрацию мочевой кислоты в крови, которая наблюдается у пациентов с подагрой и у пациентов, которым начали проводить химиотерапию по поводу рака крови.

Показания к применению

Препарат Фебуксостат Органика применяется у взрослых в возрасте от 18 лет.

- Лечение хронической гиперурикемии (повышенное содержание кислоты в крови) при состояниях, сопровождающихся отложением кристаллов уратов (при наличии тофусов (подагрических узлов) и/или подагрического артрита, в т.ч. в анамнезе);

- профилактика и лечение хронической гиперурикемии у взрослых при проведении цитостатической терапии гемобластозов с риском развития синдрома распада опухоли от умеренного до высокого (только для дозировки 120 мг).

Способ действия препарата Фебуксостат Органика

У людей с повышенной концентрацией мочевой кислоты в крови (например, при подагре) отмечаются такие симптомы, как внезапная сильная боль, покраснение, отек и воспаление в области пораженного сустава. При хронической форме заболевания пораженный сустав деформируется, возможно разрушение сустава и кости. Препарат Фебуксостат Органика

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 14.10.2026 № 19592
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

снижает концентрацию мочевой кислоты в крови, что приводит к ослаблению симптомов заболевания.

Повышение концентрации мочевой кислоты также наблюдается у пациентов со злокачественными заболеваниями крови, которым начали проводить химиотерапию. Когда проводится химиотерапия, раковые клетки разрушаются, и, если не предотвращается образование мочевой кислоты, ее уровень в крови соответственно повышается. Применение препарата Фебуксостат Органика позволяет снизить уровень мочевой кислоты в крови у таких пациентов.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Фебуксостат Органика

Противопоказания

Не принимайте препарат Фебуксостат Органика:

- если у Вас аллергия на фебуксостат или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Фебуксостат Органика проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Сообщите Вашему лечащему врачу:

- если у Вас имеет или имела место сердечная недостаточность, нарушения со стороны сердца или инсульт;

- если у Вас имеет или имело место заболевание почек и/или серьезная аллергическая реакция на аллопуринол (лекарственное средство, используемое для лечения при подагре);

- если у Вас имеет или имело место в прошлом заболевание печени или отклонение от нормы результатов функциональных проб печени;

- если Вы получаете лечение по поводу повышения уровня мочевой кислоты, имеющего место в результате синдрома Леша-Нихана (редкое наследственное заболевание, при котором в крови превышен уровень мочевой кислоты);

- если у Вас имеются заболевания щитовидной железы.

Если у Вас возникли аллергические реакции на препарат Фебуксостат Органика, прекратите прием этого препарата (см. также раздел 4). Возможные симптомы аллергических реакций:

- сыпь, включая тяжелые формы (например, пузырьки, узелки, зудящая и эксфолиативная сыпь), зуд;

- отек конечностей или лица;

- затрудненное дыхание;

- повышение температуры, сопровождающееся увеличением лимфатических узлов;

- серьезные опасные для жизни аллергические реакции, сопровождающиеся остановкой сердца и прекращением кровообращения.

Окончательное решение о прекращении лечения препаратом Фебуксостат Органика должен принять лечащий врач.

Имеются редкие сообщения о потенциально опасных для жизни случаях кожной сыпи (синдром Стивенса-Джонсона) при приеме препарата Фебуксостат Органика, которая первоначально проявлялась в виде красноватых пятен на теле, похожих на мишени, или круглых пятен, часто с пузырем в центре. Также при этом синдроме могли наблюдаться язвы

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 14.10.2026 № 19592
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

во рту, в горле, в носу, на половых органах, конъюнктивит (покраснение и отечность глаз). Сыпь может прогрессировать до широкого распространения пузырьков или шелушения кожи.

Если у Вас развился синдром Стивенса-Джонсона на фоне приема фебуксостата, Вам никогда нельзя возобновлять прием препарата Фебуксостат Органика. При возникновении сыпи или описанных кожных симптомов следует немедленно обратиться к врачу и сообщить о приеме этого препарата.

Если в данный момент у Вас имеет место приступ подагры (внезапная сильная боль, болезненность, покраснение, отечность и повышение температуры в области суставов), то, прежде чем начинать лечение препаратом Фебуксостат Органика, дождитесь, пока приступ подагры пройдет.

У некоторых людей обострение подагры может иметь место в начале лечения препаратами, предназначенными для контроля уровня мочевой кислоты. Такое обострение болезни отмечается далеко не у всех пациентов, но оно может иметь место, даже если Вы принимаете препарат Фебуксостат Органика, особенно в первые недели или месяцы лечения. Даже если у Вас обострение, важно продолжать принимать препарат Фебуксостат Органика, так как даже в этом случае препарат Фебуксостат Органика оказывает действие, направленное на снижение уровня мочевой кислоты. Если Вы будете продолжать ежедневно принимать препарат Фебуксостат Органика, то со временем обострения подагры станут более редкими и менее болезненными.

Часто при необходимости лечащий врач назначает другие лекарственные средства, способствующие предотвращению или ослаблению симптомов обострения подагры (например, боль и отек суставов).

У пациентов с очень высоким уровнем уратов (например, у тех, кто проходит химиотерапию по поводу рака), лечение препаратами для снижения уровня мочевой кислоты может привести к накоплению ксантина в мочевыводящих путях с возможным образованием камней, хотя у пациентов, принимающих препарат Фебуксостат Органика для лечения при синдроме распада опухоли, такого эффекта, не наблюдалось.

Ваш лечащий врач может назначить анализ крови, чтобы определить, нормально ли у Вас работает печень.

Прием препарата Фебуксостат Органика у пациентов, перенесших трансплантацию органов, не рекомендуется в связи с отсутствием опыта применения.

Дети и подростки

Не давайте препарат детям в возрасте от 0 до 18 лет поскольку эффективность и безопасность применения препарата в данной возрастной группе не установлены.

Другие препараты и препарат Фебуксостат Органика

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Лечащий врач может принять решение изменить дозу этих препаратов или, при необходимости, отменить прием этих препаратов или препарата Фебуксостат Органика.

Особенно это относится к перечисленным ниже препаратам, так как они могут взаимодействовать с препаратом Фебуксостат Органика:

- меркаптопурин (для лечения рака крови). При одновременном приеме препарат Фебуксостат Органика может вызвать увеличение концентрации меркаптопурина в крови, что приведет к интоксикации;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 14.10.2026 № 19592
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

- азатиоприн (для снижения иммунного ответа при различных заболеваниях). При одновременном приеме препарат Фебуксостат Органика может вызвать увеличение концентрации азатиоприна в крови, что приведет к интоксикации;

- росиглитазон (для лечения сахарного диабета). Препарат Фебуксостат Органика не оказывает значимого влияния на действие росиглитазона;

- теофиллин (для лечения астмы). Препарат Фебуксостат Органика (в дозировке 120 мг) может оказывать влияние на действие теофиллина;

- напроксен, индометацин и другие обезболивающие препараты группы НПВП. Препарат Фебуксостат Органика не оказывает значимого влияния на действие этих препаратов;

- индукторы глюкуронизации могут усиливать метаболизм и уменьшать эффективность фебуксостата;

- колхицин (для лечения подагры). Препарат Фебуксостат Органика не оказывает значимого влияния на действие колхицина;

- гидрохлоротиазид (используется для лечения отеков). Препарат Фебуксостат Органика не оказывает значимого влияния на действие гидрохлоротиазида;

- варфарин (используют для профилактики тромбозов). Препарат Фебуксостат Органика не оказывает значимого влияния на действие варфарина;

- дезипрамин (для лечения депрессии). Препарат Фебуксостат Органика не оказывает значимого влияния на действие дезипрамина;

- магния/алюминия гидроксид (для лечения при изжоге и заболеваниях желудка). Препарат Фебуксостат Органика не оказывает значимого влияния на действие антацидных препаратов.

Если Вы не уверены в том, что принимаете что-то из перечисленного, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом приема препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Беременность

Неизвестно, может ли препарат Фебуксостат Органика нанести вред Вашему будущему ребенку. Во время беременности препарат Фебуксостат Органика принимать не рекомендуется.

Грудное вскармливание

Неизвестно, может ли препарат Фебуксостат Органика переходить в грудное молоко. Если Вы кормите или планируете кормить грудью, то препарат Фебуксостат Органика принимать не рекомендуется.

Фертильность

Данные о влиянии фебуксостата на фертильность у человека отсутствуют. Не принимайте препарат Фебуксостат Органика, если планируете забеременеть.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Фебуксостат Органика оказывает слабое влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами по причине возможного появления сонливости, головокружения, чувства покалывания и онемения в ногах (парестезии), нечеткости зрения. Если у Вас возникли перечисленные симптомы, соблюдайте осторожность или воздержитесь от управления транспортными средствами, работы с механизмами до исчезновения симптомов.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 14.10.2026 № 19592
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Препарат Фебуксостат Органика содержит лактозу, натрий

Препарат Фебуксостат Органика содержит лактозы моногидрат. Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.

Препарат Фебуксостат Органика содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на 1 таблетку, то есть по сути, «не содержит натрия».

3. Прием препарата Фебуксостат Органика

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

Рекомендуемая доза

Подагра

Рекомендованная начальная доза составляет 80 мг фебуксостата один раз в сутки независимо от приема пищи. В случае, если концентрация мочевой кислоты в сыворотке крови превышает 6 мг/дл (357 мкмоль/л) через 2 – 4 недели, доза препарата может быть увеличена до 120 мг 1 раз в сутки.

Снижение концентрации мочевой кислоты в сыворотке крови на фоне приема препарата Фебуксостат Органика происходит достаточно быстро, в связи с чем контроль концентрации мочевой кислоты можно проводить через две недели от начала приема препарата. Целью лечения является снижение и поддержание концентрации мочевой кислоты в сыворотке крови менее 6 мг/дл (357 мкмоль/л).

Профилактика развития острых приступов подагры рекомендуется в течение не менее 6 месяцев (см. раздел «Особые указания и меры предосторожности»).

Синдром распада опухоли

Рекомендованная доза составляет 120 мг препарата Фебуксостат Органика один раз в сутки независимо от приема пищи. Препарат следует начинать принимать за два дня до начала цитостатической терапии. Длительность приема препарата должна составлять не менее 7 дней. В зависимости от длительности курса химиотерапии продолжительность приема препарата может быть увеличена до 9 дней.

Особые группы пациентов

Лица пожилого возраста

Коррекции дозы препарата не требуется.

Пациенты с почечной недостаточностью

Если у Вас имеются заболевания почек, сообщите Вашему лечащему врачу. Не принимайте препарат Фебуксостат Органика, если у Вас имеются тяжелые заболевания почек.

Пациенты с печеночной недостаточностью

Если у Вас имеются заболевания печени, сообщите Вашему лечащему врачу. Не принимайте препарат Фебуксостат Органика, если у Вас имеются тяжелые заболевания печени.

Применение у детей и подростков

Не давайте препарат детям в возрасте от 0 до 18 лет поскольку эффективность и безопасность применения препарата в данной возрастной группе не установлены.

Путь и (или) способ введения

Внутрь.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 14.10.2026 № 19592
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Препарат Фебуксостат Органика принимают один раз в сутки независимо от приема пищи.

Продолжительность терапии

Ваш врач принимает решение о продолжительности лечения. Вы должны продолжать принимать таблетки столько, сколько рекомендует врач.

Никогда не изменяйте дозировку препарата без предварительной консультации с врачом.

Если Вы приняли препарата Фебуксостат Органика больше, чем следовало

Если Вы случайно приняли большую дозу препарата, необходимо немедленно проинформировать лечащего врача или обратиться в ближайшее отделение неотложной помощи.

При передозировке препарата показана симптоматическая и поддерживающая терапия.

Если Вы забыли принять препарат Фебуксостат Органика

Если Вы забыли вовремя принять препарат Фебуксостат Органика, примите его сразу же, как вспомните. Если же Вы вспомнили об этом незадолго до следующего приема препарата, пропустите забытый прием и примите препарат в обычное время. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную таблетку.

Если Вы прекратили прием препарата Фебуксостат Органика

Не прекращайте прием препарата Фебуксостат Органика без предварительной консультации с врачом, даже если Вы чувствуете себя значительно лучше. Прекращение лечения может сопровождаться повышением концентрации мочевой кислоты и усугублением симптомов заболевания за счет образования новых кристаллов уратов в суставах и вокруг них, и в почках.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите прием препарата Фебуксостат Органика **и немедленно обратитесь за медицинской помощью** в случае возникновения одного из следующих симптомов **серьезных нежелательных реакций**:

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- тяжелые аллергические реакции, которые могут сопровождаться головокружением, отеком горла или языка, затруднением дыхания, снижением артериального давления, бледностью кожи, спутанностью сознания (анафилактические реакции, реакции гиперчувствительности);

- внезапно развивающийся отек лица, губ, языка и/или горла, который может вызвать затруднение дыхания или глотания (ангионевротический отек);

- тяжелые и опасные для жизни аллергические реакции на коже, для которых характерны высыпания с образованием волдырей, шелушение кожи и слизистых (включая полость рта и половые органы), болезненные язвы во рту, носу, на глазах и половых органах, высокая температура тела, обезвоживание, утомляемость (токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса-Джонсона), увеличение лимфатических узлов, воспаление печени, повышение числа лейкоцитов в крови (лекарственная реакция с эозинофилией и системными симптомами), в том числе распространение сыпи по всему телу (тяжелые формы генерализованной сыпи);

- угрожающее жизни состояние, характеризуется снижением давления крови и ухудшением кровоснабжения жизненно важных органов (сосудистый коллапс);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 14.10.2026 № 19592
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

- воспаление печени, темная моча, бледный стул, желтый цвет кожи и глаз, повышенная температура тела (гепатит);

- повреждение и последующее разрушение мышц, сопровождается болью и/или слабостью в мышцах, рвотой, темной мочой, головокружением, усталостью, спутанностью сознания (рабдомиолиз).

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Фебуксостат Органика.

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- сильная боль в суставе одного из больших пальцев стоп или другом суставе, припухлость, покраснение в области сустава (приступ подагры);

- головная боль, головокружение;

- одышка, ощущение нехватки воздуха (диспноэ);

- диарея, тошнота;

- нарушение функции печени;

- различные виды кожной сыпи, кожный зуд;

- боль в суставах (артралгия), боль в мышцах (миалгия), боль в конечности;

- отёки;

- усталость.

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- дефицит гормонов щитовидной железы (гипотиреоз), повышенная концентрация тиреотропного гормона (ТТГ) в крови;

- повышенная концентрация глюкозы в крови (сахарный диабет);

- повышенная концентрация жиров (липидов) в крови (гиперлипидемия);

- снижение аппетита, изменение вкусового восприятия;

- сонливость, вялость (летаргия), недомогание;

- увеличение массы тела;

- снижение сексуального влечения (либидо);

- бессонница;

- ощущение покалывания, онемения, ползания мурашек на коже (парестезия), ослабление мышц левой или правой половины тела (гемипарез), сниженная чувствительность кожи к раздражителям (гипостезия);

- сухость во рту, образование язв во рту, отек губ;

- частичная потеря обоняния (гипосмия), насморк или течение из носа (ринорея);

- нечеткость зрения;

- шум в ушах;

- нарушение ритма сердца (фибрилляция предсердий, блокада левой ножки пучка Гиса, синусовая тахикардия), ощущение сердцебиения, изменения на элетрокардиограмме (ЭКГ);

- кровоточивость, проявляющаяся кровоизлияниями (геморрагии), кровоизлияния из капилляров (петехии), ушиб;

- повышение давления крови, «приливы» крови к лицу, ощущение жара;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 14.10.2026 № 19592
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

- боль в животе, вздутие живота (метеоризм), изжога (гастроэзофагеальная болезнь), рвота, запор, частый стул, дискомфорт в животе (диспепсия), воспаление поджелудочной железы (панкреатит);

- воспаление бронхов (бронхит), инфекции верхних и/или нижних дыхательных путей, кашель;

- камни в желчном пузыре (холелитиаз);

- кожные аллергические реакции с кожным зудом, кожной сыпью (крапивница), покраснение кожи (эритема), воспаление кожи (дерматит), небольшие красные пятна (макулярная сыпь), сыпь с покраснением кожи и небольшими сливающимися бугорками (макуло-папулезная сыпь), узелковая сыпь (папулезная сыпь), серебристо-белая зудящая сыпь в виде бляшек (псориаз), покраснение кожи (эритема);

- повышенная потливость (гипергидроз), ночная потливость;

- облысение (алопеция);

- воспаление суставов (артрит), воспаление полости сустава с накоплением в ней жидкости (бурсит), отек суставов, скованность суставов, боль в костях и мышцах, боль в спине, слабость в мышцах, спазм, напряжение и скованность мышц;

- заболевания почек, отложение камней в почках (нефролитиаз), кровь в моче (гематурия), частое мочеиспускание (поллакиурия), белок в моче (протеинурия), нестерпимые (императивные) позывы к мочеиспусканию, инфекции мочевыводящих путей;

- неспособность к достижению или сохранению эрекции полового члена, достаточной для полноценного полового акта (эректильная дисфункция);

- боль, чувство дискомфорта в области грудной клетки;

- отклонения показателей анализа крови, которые могут помочь врачу оценить состояние Вашего организма (повышение активности амилазы, лактатдегидрогеназы, концентрации креатина и креатинина, мочевины, триглицеридов, холестерина, калия, международного нормализованного отношения (МНО), снижение количества тромбоцитов, лейкоцитов, лимфоцитов, гемоглобина, гематокрита).

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- дефицит всех клеток крови (панцитопения), снижение количества тромбоцитов (тромбоцитопения), гранулоцитов (агранулоцитоз), малокровие (анемия);

- снижение массы тела, значительная потеря веса вследствие полного отказа от пищи (анорексия);

- повышение аппетита;

- нервозность, подавленное настроение;

- расстройство сна;

- неспособность различать вкус (агевзия), воспаление слизистой оболочки полости рта (стоматит);

- чувство жжения, ощущение жара;

- нарушение кровообращения в сосудах глаза (окклюзия артерии сетчатки);

- головокружение с нарушением ориентации в пространстве (вертиго);

- инфекционное заболевание легких (пневмония);

- перфорация желудочно-кишечного тракта;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 14.10.2026 № 19592
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

- пожелтение кожи и глаз, темная моча, обесцвечивание кала, связанные с проблемами печени (желтуха), заболевания печени, воспаление желчного пузыря (холецистит);

- кожные реакции, сопровождающиеся кожным зудом, кожной сыпью, покраснением кожи, воспалительными процессами (эритема, эксфолиативная сыпь, фолликулярная сыпь, везикулярная сыпь, пустулярная сыпь, эритематозная сыпь, кореподобная сыпь);

- боль и нарушение подвижности плечевого сустава (синдром сдавления ротатора плеча), боль в области плечевого и тазового пояса (ревматическая полимиалгия);

- воспалительное заболевание почек (тубулоинтерстициальный нефрит);

- жажда;

- отклонения показателей анализа крови, которые могут помочь врачу оценить состояние Вашего организма (повышение концентрации глюкозы, удлинение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ), снижение количества эритроцитов, повышение активности щелочной фосфатазы, повышение концентрации креатинфосфокиназы).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 800 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

https://www.roszdravnadzor.gov.ru

5. Хранение препарата Фебуксостат Органика

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не принимайте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке и контурной ячейковой упаковке препарата после «до …».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Фебуксостат Органика содержит

Действующим веществом является фебуксостат.

Фебуксостат Органика 80 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит 80 мг фебуксостата.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 14.10.2026 № 19592
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются целлюлоза микрокристаллическая тип 101, целлюлоза микрокристаллическая тип 102, лактозы моногидрат, натрия кроскармеллоза, гидроксипропилцеллюлоза (гипролоза), магния стеарат, кремния диоксид коллоидный (аэросил).

Состав оболочки:

Готовая пленочная оболочка (поливиниловый спирт, титана диоксид, макрогол (полиэтиленгликоль), тальк, краситель железа оксид желтый).

Фебуксостат Органика 120 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит 120 мг фебуксостата.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются целлюлоза микрокристаллическая тип 101, целлюлоза микрокристаллическая тип 102, лактозы моногидрат, натрия кроскармеллоза, гидроксипропилцеллюлоза (гипролоза), магния стеарат, кремния диоксид коллоидный (аэросил).

Состав оболочки:

Готовая пленочная оболочка (поливиниловый спирт, титана диоксид, макрогол (полиэтиленгликоль), тальк, краситель железа оксид желтый).

Препарат Фебуксостат Органика содержит лактозу, натрий (см. раздел 2).

Внешний вид препарата Фебуксостат Органика и содержимое упаковки

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой от светло-желтого до желтого цвета. На поперечном разрезе ядро почти белого цвета.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

1, 3, 6 контурных ячейковых упаковок вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Российская Федерация

Акционерное общество «Органика» (АО «Органика»)

Адрес: 654034, Кемеровская обл. - Кузбасс, г.о. Новокузнецкий, г. Новокузнецк, район Кузнецкий, шоссе Кузнецкое, д. 3

Телефон: (3843) 994-222

Адрес электронной почты: root@organica.su

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

Акционерное общество «Органика» (АО «Органика»)

Адрес: Кемеровская обл. - Кузбасс, г.о. Новокузнецкий, г. Новокузнецк, район Кузнецкий, шоссе Кузнецкое, д. 3, 654034 – Российская Федерация

Телефон: (3843) 994-222

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 14.10.2026 № 19592
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Адрес электронной почты: root@organica.su

Прочие источники информации

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) https://grls.rosminzdrav.ru/ (https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC).