ЛП-№(016488)-(РГ-RU) от 02.09.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 13.08.2026 № 16107
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Пентоксифиллин, 400 мг, таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

Пентоксифиллин, 600 мг, таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

Действующее вещество: пентоксифиллин

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Пентоксифиллин, и для чего его применяют.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Пентоксифиллин.

3. Прием препарата Пентоксифиллин.

4. Возможные нежелательные реакции.

5. Хранение препарата Пентоксифиллин.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Пентоксифиллин, и для чего его применяют

Препарат Пентоксифиллин содержит действующее вещество пентоксифиллин, которое относится к фармакотерапевтической группе «периферические вазодилататоры; производные пурина». Пентоксифиллин улучшает симптомы нарушений мозгового кровообращения. При окклюзионных заболеваниях периферических артерий (это аномальное сужение артерий ног и рук, что приводит к ухудшению кровообращения) препарат приводит к удлинению дистанции ходьбы, устранению ночных судорог в икроножных мышцах и исчезновению боли в покое.

Показания к применению

Препарат Пентоксифиллин применяется у взрослых в возрасте от 18 лет.

- Окклюзионная болезнь периферических артерий атеросклеротического или диабетического происхождения (например, «перемежающаяся» хромота, диабетическая ангиопатия);

- трофические нарушения (например, трофические язвы голеней, гангрена);

- нарушения мозгового кровообращения (последствия атеросклероза в мозге, например, снижение концентрации внимания, головокружение, ухудшение памяти), ишемические и постинсультные состояния;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 13.08.2026 № 16107
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

- нарушения кровообращения в сетчатой и сосудистой оболочке глаза;

- отосклероз, дегенеративные изменения на фоне патологии сосудов внутреннего уха и снижения слуха.

Способ действия препарата Пентоксифиллин

Препарат уменьшает вязкость крови и улучшает «текучесть» крови. Обладая сосудорасширяющим действием, улучшает снабжение тканей кислородом в зонах нарушенного кровообращения, в частности, в конечностях, центральной нервной системе, и, в меньшей степени, в почках. При нарушении мозгового кровообращения улучшает симптоматику.

Если улучшение не наступило, или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Пентоксифиллин

Противопоказания

Не принимайте препарат Пентоксифиллин:

- если у Вас аллергия на пентоксифиллин, другие метилксантины или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);

- если у Вас массивные кровотечения, т.к. повышается риск усиления кровотечения;

- если у Вас обширные кровоизлияния в сетчатую оболочку глаза;

- если у Вас кровоизлияние в головной мозг;

- если у Вас острый инфаркт миокарда;

- если Вы беременны или кормите грудью (см. раздел «Беременность, грудное вскармливание и фертильность»).

Если Вы считаете, что любое из вышеперечисленного относится к Вам, обязательно сообщите об этом Вашему лечащему врачу до начала лечения препаратом Пентоксифиллин.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Пентоксифиллин проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Сообщите Вашему лечащему врачу, если какой-либо из нижеуказанных пунктов относится к Вам:

- если у Вас нарушение сердечного ритма, т.к. Ваше состояние может ухудшиться;

- если у Вас пониженное давление (артериальная гипотензия), т.к. имеется риск дальнейшего снижения давления. Ваш лечащий врач уменьшит дозу препарата Пентоксифиллин. Контролируйте Ваше давление крови;

- если у Вас хронические заболевания сердца;

- если у Вас язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

- если у Вас тяжелые нарушения функции почек и/или печени, т.к. повышается риск развития нежелательных реакций;

- если Вы недавно перенесли хирургическое вмешательство (т.к. есть риск возникновения кровотечений). В таком случае лечащий врач назначит Вам регулярный контроль показателей гемоглобина и гематокрита;

- если у Вас повышенный риск развития кровотечений, т.к. повышается риск развития более тяжелых кровотечений;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 13.08.2026 № 16107
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

- если Вы принимаете препараты:

• которые уменьшают вязкость крови (антикоагулянты), контролируйте показатели свертывающей системы крови;

• способствующие разжижению крови – клопидогрел, эптифибатид, тирофибан, эпопростенол, илопрост, абциксимаб, анагрелид, обезболивающие препараты (нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)), ацетилсалициловая кислота в дозе до 300 мг, тиклопидин, дипиридамол;

• для лечения при сахарном диабете, т.к. повышается риск развития гипогликемии (пониженная концентрация глюкозы в крови). В этом случае лечащий врач будет корректировать дозы инсулина и/или гипогликемических препаратов. Регулярно контролируйте концентрацию глюкозы в крови;

• для лечения микробной инфекции (ципрофлоксацин), у лиц пожилого возраста врач может уменьшить дозу препарата Пентоксифиллин;

• для лечения астмы (теофиллин);

- если Вы курите, т.к. курение может снижать лечебное действие препарата Пентоксифиллин.

Дети и подростки

Не давайте препарат детям в возрасте от 0 до 18 лет поскольку эффективность и безопасность применения препарата в данной возрастной группе не установлены.

Другие препараты и препарат Пентоксифиллин

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты, в том числе отпускаемые без рецепта.

Пентоксифиллин может взаимодействовать с другими лекарственными препаратами, что может увеличить или уменьшить эффект принимаемых препаратов или увеличить риск развития нежелательных реакций принимаемых препаратов. Сообщите лечащему врачу, если Вы принимаете какой-либо из нижеперечисленных лекарственных препаратов:

- препараты для лечения повышенного артериального давления (ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента);

- лекарственные средства для лечения заболеваний сердца и сосудов (нитраты);

- препараты, которые уменьшают вязкость крови (прямые и непрямые антикоагулянты);

- тромболитики (препараты для растворения тромбов);

- цефалоспорины (антибиотики);

- циметидин (препарат для лечения изжоги и заболеваний желудочно-кишечного тракта);

- ксантины (группа препаратов для лечения астмы);

- инсулин и препараты для приема внутрь при сахарном диабете;

- теофиллин (препарат для лечения астмы);

- ципрофлоксацин (антибиотик);

- препараты для разжижения крови: клопидогрел, эптифибатид, тирофибан, эпопростенол, илопрост, абциксимаб, анагрелид, тиклопидин, дипиридамол, ацетилсалициловая кислота в дозе до 300 мг;

- обезболивающие противовоспалительные препараты группы нестероидных противовоспалительных препаратов, кроме селективных ингибиторов циклооксигеназы-2;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 13.08.2026 № 16107
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

- кеторолак (для обезболивания).

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Беременность

Данные о применении пентоксифиллина во время беременности отсутствуют. Не принимайте препарат Пентоксифиллин во время беременности.

Грудное вскармливание

Пентоксифиллин проникает в грудное молоко у человека в незначительных количествах. Не принимайте препарат Пентоксифиллин, если кормите грудью. Если лечение препаратом необходимо, прекратите грудное вскармливание.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

При применении препарата Пентоксифиллин возможно появление нежелательных реакций, таких как, например, головокружение, поэтому во время применения препарата Пентоксифиллин необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами, механизмами и занятиях другими потенциально опасными видами деятельности, требующих концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

3. Прием препарата Пентоксифиллин

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

Рекомендуемая доза

Рекомендуемая доза – 400 мг (1 таблетка препарата Пентоксифиллин) 2 – 3 раза в сутки или 600 мг (1 таблетка препарата Пентоксифиллин) 1 раз в сутки. Пациентам с тяжелыми состояниями может потребоваться назначение препарата по 1 таблетке 600 мг 2 раза в сутки (утром и вечером).

Максимальная суточная доза – 1200 мг. Дозу препарата подбирает врач в соответствии с индивидуальными особенностями пациента.

Особые группы пациентов

Пациенты с почечной недостаточностью

У пациентов с нарушенной функцией почек с клиренсом креатинина (КК) < 30 мл/мин дозировку уменьшают до 400 мг 1 – 2 раза в сутки или 600 мг 1 раз в сутки.

Пациенты с печеночной недостаточностью

Пациентам с тяжелым нарушением функции печени необходимо уменьшение дозы с учетом индивидуальной переносимости.

Пациенты с низким артериальным давлением

Препарат Пентоксифиллин может понижать Ваше давление. Чтобы избежать чрезмерного понижения давления, Ваш лечащий врач может начать лечение малыми дозами и увеличивать дозу только постепенно.

Применение у детей и подростков

Препарат Пентоксифиллин не следует применять у детей и подростков в возрасте до 18 лет.

Путь и (или) способ введения

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 13.08.2026 № 16107
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Внутрь.

Таблетки следует проглатывать целиком, во время или сразу после приема пищи, запивая достаточным количеством жидкости.

Продолжительность терапии

Ваш врач принимает решение о продолжительности лечения. Вы должны продолжать принимать таблетки столько, сколько рекомендует врач.

Никогда не изменяйте дозировку препарата без предварительной консультации с врачом.

Если Вы приняли препарата Пентоксифиллин больше, чем следовало

При появлении первых признаков передозировки (потливость, тошнота, посинение кожи) немедленно прекратите прием препарата. Если Вы приняли препарат недавно, промойте желудок, выпив большое количество воды, примите активированный уголь или другой сорбент для уменьшения всасывания препарата в желудочно-кишечном тракте.

У Вас также могут появиться симптомы: головокружение, тошнота, рвота типа «кофейной гущи», выраженное снижение артериального давления, частый ритм сердца (тахикардия), нерегулярный ритм сердца (аритмия), покраснение кожи, потеря сознания, озноб, отсутствие рефлексов, судороги.

В случае возникновения вышеописанных симптомов немедленно обратитесь к лечащему врачу или в отделение экстренной медицинской помощи ближайшей больницы. По возможности возьмите с собой упаковку препарата и данный листок-вкладыш, чтобы показать врачу, какой препарат Вы приняли.

Если Вы забыли принять препарат Пентоксифиллин

Если Вы забыли вовремя принять препарат Пентоксифиллин, примите его сразу же, как вспомните. Если же Вы вспомнили об этом незадолго до следующего приема препарата, пропустите забытый прием и примите препарат в обычное время. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную таблетку.

Если Вы прекратили прием препарата Пентоксифиллин

Не прекращайте прием препарата Пентоксифиллин без предварительной консультации с врачом, даже если Вы чувствуете себя значительно лучше.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите прием препарата Пентоксифиллин **и немедленно обратитесь за медицинской помощью** в случае возникновения одного из следующих симптомов **серьезных нежелательных реакций**:

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно):

- тяжелые состояния, при которых снижено количество кровяных клеток в крови (лейкопения/нейтропения, тромбоцитопения, панцитопения);

- снижение содержания фибриногена в крови (гипофибриногенемия);

- аллергические реакции немедленного типа, сопровождаются сыпью на коже, зудом и отеком кожи, одышкой, головокружением, резким снижением давления, возможна потеря сознания (анафилактические/анафилактоидные реакции);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 13.08.2026 № 16107
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

- отек лица, губ, языка и/или горла, которые могут вызвать затруднение дыхания или глотания, интенсивный зуд кожи, появление сыпи и/или волдырей (ангионевротический отек);

- аллергическая реакция немедленного типа, которая развивается в пределах от 1 – 2 до 15 – 30 минут при повторном введении аллергена, проявляется в виде резкого понижения давления, нарушения сознания, отека и покраснения кожи, одышки и кашля (анафилактический шок);

- одышка и кашель (бронхоспазм);

- воспаление мозговых оболочек (асептический менингит);

- частый ритм сердца (тахикардия);

- боль и дискомфорт в области груди (стенокардия);

- снижение артериального давления;

- кровотечения из желудка и/или кишечника;

- нарушение образования, выделения или выведения желчи из желчных путей в кишечник при поражении клеток печени (внутрипеченочный холестаз).

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Пентоксифиллин.

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно):

- сильное эмоциональное возбуждение, сопровождаемое чувствами страха и тревоги и двигательным беспокойством (ажитация), нарушения сна;

- головная боль, головокружение;

- нерегулярный ритм сердца (аритмия);

- судороги;

- дефект поля зрения с появлением «слепых зон» (скотома), нарушение зрения;

- кровотечения, в том числе кровотечения из сосудов кожи, слизистых оболочек;

- «приливы» крови к кожным покровам, отеки;

- снижение тонуса мышц кишечника (атония кишечника);

- повышенное слюноотделение (гиперсаливация), сухость во рту (ксеростомия), чувство давления и переполнения в области желудка, тошнота, рвота, диарея, запор;

- кожный зуд, кожная сыпь, покраснение кожи эритема, крапивница (как правило, проявляется волдырями на коже с сильным зудом);

- ломкость ногтей;

- отказ от питания с отсутствием аппетита при потребности в пище (анорексия);

- отклонения показателей результатов анализа крови, которые могут помочь врачу оценить функцию печени (повышение активности «печеночных» трансаминаз);

- отклонения показателей анализа крови, которые могут помочь врачу оценить состояние костной ткани (повышение активности щелочной фосфатазы).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 13.08.2026 № 16107
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 800 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https:// www.roszdravnadzor.gov.ru

5. Хранение препарата Пентоксифиллин

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на пачке из картона и на контурной ячейковой упаковке после «до …».

Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Храните при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Пентоксифиллин содержит

Действующим веществом является пентоксифиллин.

Пентоксифиллин, 400 мг, таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

Каждая таблетка с пролонгированным высвобождением, покрытая пленочной оболочкой, содержит 400 мг пентоксифиллина.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза К15М CR), повидон К-90, тальк, магния стеарат.

Состав оболочки:

Готовая пленочная оболочка (гипромеллоза, титана диоксид, тальк, макрогол 8000).

Пентоксифиллин 600 мг, таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

Каждая таблетка с пролонгированным высвобождением, покрытая пленочной оболочкой, содержит 600 мг пентоксифиллина.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза К15М CR), повидон К-90, тальк, магния стеарат.

Состав оболочки:

Готовая пленочная оболочка (гипромеллоза, титана диоксид, тальк, макрогол 8000).

Внешний вид препарата Пентоксифиллин и содержимое упаковки

Пентоксифиллин, 400 мг, таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 13.08.2026 № 16107
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой белого или почти белого цвета. На поперечном разрезе ядро почти белого цвета.

Пентоксифиллин, 600 мг, таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

Круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой белого или почти белого цвета. На поперечном разрезе ядро почти белого цвета.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

По 2, 3 или 5 контурных ячейковых упаковок вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Россия

Акционерное общество «Органика» (АО «Органика»)

Адрес: 654034, Кемеровская обл. - Кузбасс, г.о. Новокузнецкий, г. Новокузнецк, район Кузнецкий, шоссе Кузнецкое, д. 3

тел. (3843) 994-222

адрес электронной почты: root@organica.su

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Россия

Акционерное общество «Органика» (АО «Органика»)

Адрес: Кемеровская обл. - Кузбасс, г.о. Новокузнецкий, г. Новокузнецк, район Кузнецкий, шоссе Кузнецкое, д. 3, 654034 - Россия

тел. (3843) 994-222

адрес электронной почты: root@organica.su

Прочие источники информации

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) Евразийского экономического союза (https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC).